

Số: 317A/IMEX
V/v Cung cấp thông tin
hướng dẫn pha tiêm thuốc Nerusyn 1,5g

TP. Cao Lãnh, ngày 06 tháng 11 năm 2018

Kính gửi: *Bệnh Viện Đa Khoa K.V. Hồng Ngự*

Công ty CP Dược phẩm Imexpharm đã được Cục Quản lý Dược cấp số đăng ký lưu hành thuốc bột pha tiêm Nerusyn 1,5g (Ampicilin 1 g; Sulbactam 0,5g) VD-26158-17.

Khi biên soạn nội dung tờ hướng dẫn sử dụng thuốc, chúng tôi đã tham khảo hướng dẫn sử dụng thuốc tham chiếu UNASYN 1,5g và hướng dẫn tiêm/truyền một số loại kháng sinh trong Quyết định 708/QĐ-BYT ngày 02/03/2015.

Nay Công ty xin cung cấp bổ sung thông tin hướng dẫn pha tiêm để pha dung dịch pha tiêm tĩnh mạch và tiêm truyền tĩnh mạch trong nội dung đính kèm.

Ngoài ra, chúng tôi có tìm thông tin để cập nhật thông tin hướng dẫn sử dụng cho thuốc này. Hiện nay, thông tin thuốc UNACIM 0,5g/1g (Ampicilin 1 g + Sulbactam 0,5g) cập nhật mới nhất trên website Cục Quản lý Dược Pháp, dung dịch tiêm tĩnh mạch được pha như sau: Hòa tan 1 lọ với ít nhất 3,2 ml nước cất pha tiêm, và tiêm tĩnh mạch chậm trong ít nhất 03 phút sau khi dung dịch tan hoàn toàn.

Chúng tôi xin gửi đính kèm:

- Quyết định 708/QĐ-BYT, Phụ lục 4 - Hướng dẫn tiêm/truyền một số loại kháng sinh.
- Hướng dẫn sử dụng thuốc tham chiếu UNASYN 1,5g và thuốc UNACIM 1,5g.

Xin chân thành cảm ơn,

Trân trọng kính chào,

* Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu.

TỔNG GIÁM ĐỐC
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Phan
TS. Lê Văn Nhã Phương



**CUNG CẤP THÔNG TIN HƯỚNG DẪN PHA TIÊM
THUỐC NERUSYN 1,5g VD-26158-17**

LIỀU LƯỢNG – CÁCH DÙNG:

- Khi tiêm truyền tĩnh mạch, thuốc được pha với nước pha tiêm vô khuẩn hoặc dung dịch thích hợp (xem hướng dẫn sử dụng). Để đảm bảo thuốc tan hoàn toàn, nên để yên cho bột trong dung dịch mất hẳn và kiểm tra bằng mắt.
- Thuốc dùng tiêm tĩnh mạch: Pha 1 lọ với 3,2 ml nước cất để pha tiêm. Có thể tiêm tĩnh mạch chậm trong ít nhất 10-15 phút.
- Thuốc dùng tiêm truyền tĩnh mạch: Pha 1 lọ với 3.2 ml nước cất để pha tiêm, sau đó pha loãng ngay với 50-100 ml dịch pha loãng tương hợp để tiêm truyền tĩnh mạch trong 15-30 phút.
- Thuốc có thể tiêm bắp sâu sau khi hòa tan với 3,2 ml nước cất để pha tiêm hoặc dung dịch lidocaine hydroclorid 0,5% hay 2%.

Hướng dẫn sử dụng:

- Dung dịch đậm đặc để tiêm bắp nên dùng trong vòng một giờ sau khi pha.
- Thời gian sử dụng nếu truyền tĩnh mạch đối với những dung dịch pha thuốc khác nhau:

Dung dịch pha loãng	Nồng độ Ampicilin + Sulbactam (mg/ml)	Thời gian sử dụng (giờ)	
		25°C	4°C
Nước pha tiêm vô khuẩn	45	8	
	45		48
	30		72
Natri clorid đẳng trương	45	8	
	45		48
	30		72
Dung dịch Dextrose 5% trong nước	15 - 30	2	
	30	4	
	30		4
Dung dịch Dextrose 5% trong NaCl 0,45%	3	4	
	15		4
Dung dịch đường đã nghịch chuyển 10% trong nước	3	4	
	30		3
Dung dịch Lactate Ringer	45	8	
	45		24